

## Ibufen<sup>®</sup> dla dzieci FORTE o smaku malinowym w postaci zawiesiny, 100 ml

Dawka dobowa zawiesiny Ibufen<sup>®</sup> dla dzieci FORTE zależy od masy ciała w dawkach podzielonych zgodnie z tabelą:

MASA CIAŁA (WIEK DZIECKA)	DAWKA JEDNORAZOWA	CZĘSTOTLIWOŚĆ PODANIA NA DOBĘ
5-7,6 kg (3-6 miesięcy)	1,25 ml (1 x 50 mg)	3 razy
7,7-9 kg (6-12 miesięcy)	1,25 ml (1 x 50 mg)	3 do 4 razy
10-15 kg (1-3 lat)	2,5 ml (1 x 100 mg)	3 razy
16-20 kg (4-6 lat)	3,75 ml (1 x 150 mg)	3 razy
21-29 kg (7-9 lat)	5 ml (1 x 200 mg)	3 razy
30-40 kg (10-12 lat)	7,5 ml (1 x 300 mg)	3 razy
Powyżej 40 kg (dzieci i młodzież od 12 lat i dorośli)	5-10 ml (200-400 mg)	3 razy

Dzięki dołączonej strzykawce doustnej możesz precyzyjnie odmierzyć i podać lek w postaci zawiesiny.

Minimalna przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami - 6 godzin, nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Lek podaje się po posiłkach, z dużą ilością płynów.